

Obavijest maslinarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Petak, 21 Lipanj 2019 16:27

Autor: JUO

Pregleda: 1082



Upozoravamo maslinare s područja **Istre**, da bilježimo let **druge generacije maslininog moljca** (*Prays oleae*), srednjeg do pojačanog intenziteta.

Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-3 mm.

Tretiranje protiv ove generacije provodi se **kad je plod veličine 4-5 mm**. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade.

Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza.

Preparati koji se mogu koristiti u tu svrhu jesu preparati na bazi *Bacillus thuringiensis* (**Biobit WP** , **Baturad WP**), preparati na bazi **dimetoata** (**Rogor 40**, **Chromogor**, **Perfekthion**, **Calinogor**) ili preparati na bazi **deltametrina** (**Decis 2,5 EC**, **Decis 100 EC**, **Ritmus**, **Scatto**, **Rotor super**, **Poleci plus**) , preparat na bazi **fosmeta** (**Imidan**), preparat na bazi cipermetrina (**Cythrín max**) ili preparat na bazi piretrina (**ASSET**).

Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisutnost **maslininog svrdlaša** (*Caenorhinus* /*Rhynchites cribripennis*), metodom otresanja na bijelu podlogu **jedanput tjedno**.

Obavijest maslinarima!

Kategorija: Objave

Objavljeno: Petak, 21 Lipanj 2019 16:27

Autor: JUO

Pregleda: 1082

Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje. (Napomena: Rogor 40 je registriran u RH i za suzbijanje **maslininog svrdlaša**).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: <http://fis.mps.hr/trazilिकासzb/>.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.