

Avviso ai viticoltori!

Categoria: Novità

Pubblicato: Venerdì, 09 Luglio 2021 19:30

Scritto da JUO

Visite: 484



Si consiglia ai viticoltori di continuare ad effettuare la difesa delle loro piantagioni concentrandola contro l'**oidio** (*Erysiphe necator*) e la **peronospora** (*Plasmopara viticola*).

Contro l'oidio consigliamo di usare uno dei seguenti prodotti: **Mystic EC**, **Nativo WG**, **Collis**, **Luna Experience**, **Vivando SC**, **Difcor EC** o qualche altro prodotto che non sia stato usato per più di 3 volte durante la stagione (<http://fis.mps.hr/trazilिकासzb/>)

Contro la peronospora consigliamo di usare uno dei seguenti prodotti: **Galben M**, **Fantic M**, **Acrobat MZ WG**, **Forum star**, **Ridomil Gold MZ Pepite**, **Mildicut Sc** o qualche altro prodotto (<http://fis.mps.hr/trazilिकासzb/>).

In conformità alla Direttiva sull'adozione delle misure atte a prevenire la diffusione e per la soppressione della Flavescenza dorata della vite (GU 48/2018), a tre settimane dal primo intervento va effettuato il secondo trattamento contro il **grillo americano** (*Scaphoideus titanus*), il quale trasmette (vettore) la **Flavescenza dorata della vite** (*Grapevine flavescens doree*) nella **zona delimitata**.

I proprietari di vigneti nella zona delimitata hanno l'obbligo di monitorare la presenza del grillo americano posizionando le apposite placchette appiccicose di colore giallo nelle loro piantagioni, di

Avviso ai viticoltori!

Categoria: Novità

Publicato: Venerdì, 09 Luglio 2021 19:30

Scritto da JUO

Visite: 484

verificare la presenza dei sintomi della malattia e di attuare le misure di protezione.

L'area delimitata comprende l'area infetta (punto focale) che si estende su 1 km di larghezza a partire dal luogo in cui è stata rilevata la presenza della Flavescenza dorata della vite e si estende su un'area di sicurezza dalla larghezza di 5 km a partire dai bordi dell'area infetta.

Per contrastare il grillo americano, in Croazia, sono stati registrati i seguenti insetticidi: **Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Pyregard, Krisant EC e Asset Five.**

Per proteggere le api, è necessario falciare le superfici fiorite nei vigneti ed effettuare il trattamento nelle ore serali, quando non ci sono api.

I prodotti vanno usati secondo le indicazioni dei produttori!

Dopo il trattamento va compilata la lista di evidenza per l'uso dei prodotti per la difesa delle piante (SZB)!

Avvisiamo inoltre i viticoltori che per la difesa dei vigneti si possono usare soltanto i prodotti registrati per la difesa delle piante (SZB).

I dati riguardanti i prodotti registrati per la difesa delle piante nella Repubblica di Croazia sono evidenziati nel Sistema informatico fitosanitario (FIS) che è disponibile al sito web:

<http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

Marina.kocijancic@mps.hr